

INFORMATION : pour les contacts au sein du foyer :

- Pour les enfants de moins de 12 ans :

- Les enfants qui ont eu un **contact étroit au sein de la famille et qui ne peuvent pas s'isoler du cas index** doivent réaliser un test le plus rapidement possible et une quarantaine jusqu'à la fin de la période d'isolement du cas index. Cette quarantaine peut prendre fin à condition d'avoir un résultat négatif à un test PCR à cette date. Un test additionnel devra toujours être réalisé 7 jours plus tard, soit 7 jours après la fin de l'isolement du cas index (J17). Si les parents choisissent de ne pas tester un enfant, la durée de la quarantaine sera de toute la période d'isolement du cas index, suivie de 10 jours supplémentaires de quarantaine.

- **Si le cas index peut s'isoler complètement** (p.ex. le cas index quitte la maison de famille pour la période de l'isolement) : un premier test doit être réalisé le plus rapidement possible, la quarantaine dure jusqu'à 10 jours après la dernière exposition, ou jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif au test J7 après la dernière exposition.

- Si des symptômes apparaissent, il est nécessaire de réaliser un test le plus rapidement possible et de se référer aux procédures d'un cas possible de COVID-19.

- Pour les jeunes de plus de 12 ans :

- **Si le cas index ne peut ou ne veut pas s'isoler de ses cohabitants,**

Pour les jeunes pas ou pas complètement vaccinés : le dernier contact à haut risque ne sera considéré qu'à la fin de la période de contagion du cas index et il faut en tenir compte pour déterminer la durée de la quarantaine. Un premier test doit toujours être réalisé dès l'identification du contact à haut risque. Un deuxième test peut être réalisé à la fin de l'isolement du cas index (10^{ème} jour). Si le test est négatif, la quarantaine pour la personne contact prend fin. Toutefois, un troisième test 7 jours suivant la fin de l'isolement du cas index ('J17'), reste nécessaire. En absence de testing, la quarantaine sera prolongée de 10 jours après la fin de la période de l'isolement.

Pour les jeunes vaccinés : le premier test est effectué 3 à 6 jours après l'apparition des symptômes/test positif chez le patient index. Si ce test est négatif, la quarantaine peut être levée. Cependant, un second test doit être effectué à la fin de la période infectieuse du patient index (c'est-à-dire à partir du 10^{ème} jour après l'apparition des symptômes/test positif chez le cas index, lorsque ce dernier met fin à l'isolement).

- **Si le cas index peut s'isoler complètement** (p.ex le cas index quitte la maison de famille pour la période de l'isolement):

Pour les jeunes pas ou pas complètement vacciné : réalisation d'un test dans un délai de 3 jours. La quarantaine dure jusqu'à 10 jours après la dernière exposition, ou jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif au test J7 après la dernière exposition pour les enfants.

□ Pour les jeunes vaccinés : ils ne seront temporairement testés avec PCR qu'une seule fois, entre jour 3 et jour 6 après le contact à risque (de préférence au jour 5). En attendant du résultat une quarantaine s'applique. La quarantaine peut éventuellement être levée à partir du 4^{ème} jour à condition qu'un autotest négatif ait été effectué. Si nécessaire, cet autotest doit être répété chaque jour. La période de vigilance se poursuit jusqu'au 14^{ème} jour.

□ Si des symptômes apparaissent, il est nécessaire de réaliser un test le plus rapidement possible et de se référer aux procédures d'un cas possible de COVID-19.

Document source :

*OPÉRATIONNALISATION TRACING VIA CALL CENTER AVIQ/COCOM, EN
COLLABORATION AVEC LES SPSE ET CPMS-WBE
ACTUALISATION 04/12/21*